

การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บสมองร่วมกับภาวะช็อก : กรณีศึกษา เปรียบเทียบ 2 ราย

โดย

นางสาวศิริรัตน์ เพ็ญแสงทอง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กลุ่มงานการพยาบาลงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลระนอง

วัตถุประสงค์

1. ศึกษา เปรียบเทียบ การดูแลPT บาดเจ็บสมองร่วมกับภาวะช็อก
2. ศึกษาความเหมือนและความแตกต่างการดูแลPT บาดเจ็บสมองร่วมกับภาวะช็อก

ตารางเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป	กรณีศึกษาที่1	กรณีศึกษาที่2
เพศ	ชาย	ชาย
อายุ	13 ปี	62 ปี
โรคประจำตัว	ไม่มี	เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ปัจจัยเสี่ยง	ไม่ดื่มสุรา	ดื่มสุรา
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	ไม่สวมหมวกนิรภัย	ไม่สวมหมวกนิรภัย

ตารางเปรียบเทียบการตรวจวินิจฉัยและการรักษา

รายการ	กรณีศึกษาที่1	กรณีศึกษาที่2
CT scan	Epidural Hemorrhage at Left Frontal	Subarachnoid hemorrhage with parietal lobe contusion
X-ray	Closed fracture Left femur	Closed fracture right of mandible closed fracture right ankle
จำนวนวันนอน SW.	4 วัน	6 วัน

ตารางเปรียบเทียบข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลในภาวะวิกฤต

รายการ	กรณีศึกษาที่1	กรณีศึกษาที่2
• ระดับความรู้สึกตัวลดลง • มีภาวะซีด • ศีรษะได้รับความกระทบกระเทือน • วิตกกังวลกับภาวะโรค	• E 1V2M5 • BP 92/64 mmHg P 144 ครั้ง/นาที RR28 ครั้ง/นาที • pupil Rt 3 min RTL Lt บวมปิด • ชักเกร็ง	• E 1V1M2 • BP 80/64 mmHg P 140 ครั้ง/นาที RR12 ครั้ง/นาที • pupil Rt 2 min RTL Lt 1.5 min RTL • คางบวมถึงคอ • ไม่มีชักเกร็ง

ขอขอบคุณค่ะ



โรงพยาบาลระนอง
Ranong Hospital